

# Módulo de Leis dos Senos e dos Cossenos

## Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo.

1ª série E.M.



**Leis dos Senos e dos Cossenos**  
**Razões trigonométricas no triângulo retângulo.**

## 1 Exercícios Introdutórios

**Exercício 1.** A Recíproca do Teorema de Pitágoras, enuncia que:

“se as medidas dos três lados de um triângulo qualquer satisfazem a fórmula  $a^2 = b^2 + c^2$ , então esse triângulo é retângulo”.

Dentre os ternos  $(a, b, c)$  de números inteiros listados, com  $a < b < c$ , qual(is) dele(s) poderiam ser lados de triângulo(s) retângulo(s)?

- a) (5, 12, 13).
- b) (8, 15, 17).
- c) (7, 24, 25).
- d) (12, 35, 37).
- e) (11, 60, 61).
- f) (20, 21, 29).
- g) (9, 40, 41).

**Exercício 2.** Dentre os ângulos agudos dos triângulos retângulos do exercício 1, qual possui o maior seno?

**Exercício 3.** Quais os senos, cossenos e tangentes dos ângulos agudos do triângulo de lados 6 cm, 8 cm e 10 cm?


**Exercício 4.** Um triângulo tem lados medindo 3 cm, 4 cm e 5 cm. Outro triângulo tem lados medindo 9 cm, 12 cm e 15 cm. Os ângulos desses triângulos são iguais?

**Exercício 5.** Utilizando os dados aproximados da tabela 2, calcule o que se pede.


Tabela 2: Senos, cossenos e tangentes.

Arco	sen	cos	tg
15°	0,26	0,97	0,27
20°	0,34	0,93	0,37
30°	0,5	0,87	0,58
40°	0,64	0,77	0,84
57°	0,84	0,54	1,54
80°	0,98	0,17	5,67


a) Determine valor de  $AC = x$ .



b) Determine valor de  $AB = x$ .



c) Determine valor de  $BD = x + y$ .



- d) Seja o  $\triangle ABC$ , retângulo em  $B$ , com  $B\hat{A}C = 15^\circ$  e  $D \in AB$  tal que  $A\hat{D}C = 150^\circ$ . Sendo  $DB = 400$  cm, qual o valor de  $AC$ ?
- e) Um triângulo retângulo possui catetos medindo 34 e 93, qual a medida aproximada do ângulo oposto ao cateto de menor medida?
- f) Um triângulo retângulo possui catetos medindo 26 e 97. Qual a medida aproximada do ângulo oposto ao cateto de maior medida?
- g) Num triângulo retângulo com um ângulo medindo  $30^\circ$ , prove que o seu cateto oposto é metade da hipotenusa.

**Exercício 6.** No triângulo da figura 2, calcule os valores dos senos, cossenos e tangentes de  $\alpha$  e  $\beta$ .




Figura 2

**Exercício 7.** Sendo  $0 < \alpha < 90^\circ$  e  $\text{sen } \alpha = 0,6$ . Quais os valores do cosseno e da tangente de  $\alpha$ ?

**Exercício 8.** Definindo a  $\text{sec } x = \frac{1}{\cos x}$ , demonstre, a partir da relação fundamental da trigonometria, que

$$\text{tg}^2 x + 1 = \text{sec}^2 x.$$

**Exercício 9.** A figura 3 representa um  $\triangle ABC$ , equilátero, com lado medido 2 cm e uma altura  $BH$ .




Figura 3

Quais os valores do(a):

- $\text{sen } 60^\circ$ ,  $\text{cos } 60^\circ$  e  $\text{tg } 60^\circ$ ?
- $\text{sen } 30^\circ$ ,  $\text{cos } 30^\circ$  e  $\text{tg } 30^\circ$ ?

**Exercício 10.** A partir de um quadrado de lado medindo 1 cm, determine as medidas dos seno, cosseno e da tangente de  $45^\circ$ .

**Exercício 11.** Sendo  $\alpha$  um ângulo agudo num triângulo retângulo qualquer, prove que

$$\text{sen } \alpha \cdot \text{cos } \alpha \cdot \text{tg } \alpha = \text{sen}^2 \alpha.$$

## 2 Exercícios de Fixação

**Exercício 12.** Sobre uma rampa de 6 m de comprimento e inclinação de  $30^\circ$  com a horizontal, devem-se construir degraus de altura 25 cm. Quantos degraus desse tipo serão construídos?

**Exercício 13.** Um observador está em um ponto A do aterro do Flamengo e vê o Pão de Açúcar segundo um ângulo de  $10^\circ$  com o plano horizontal (medido com o teodolito). Ele anda em direção ao seu objetivo até um ponto B distante 650 m de A e agora vê o Pão de Açúcar segundo um ângulo de  $14^\circ$ . Qual é a altura do Pão de Açúcar em relação ao plano de observação?

Dados:  $\text{tg } 10^\circ = 0,1763$  e  $\text{tg } 14^\circ = 0,2493$ .

**Exercício 14.** Ao atender o chamado de um incêndio em um edifício, o corpo de bombeiros de uma cidade utilizou um veículo de combate a incêndio, dotado de escada magirus. Esse veículo possibilita atender a resgates a uma altura máxima de 54 metros, utilizando um ângulo máximo de levantamento de  $60^\circ$ .




Figura 8

- Qual o comprimento dessa escada quando totalmente esticada?
- Houve um problema e o ângulo de levantamento foi reduzido em 25%. Qual a nova altura máxima alcançada?

**Exercício 15.** Seja  $x$  um número real positivo tal que

$$\text{sec } x - \text{tg } x = 1.$$


Calcule  $\text{sec } x + \text{tg } x$ .

**Exercício 16.** No triângulo  $ABC$ ,

$$3 \text{ sen } A + 4 \text{ cos } B = 6 \quad \text{e} \quad 4 \text{ sen } B + 3 \text{ cos } A = 1$$

Encontre a medida do ângulo  $C$ .

**Exercício 17.** A inclinação de um telhado é determinada pela porcentagem da medida do cateto oposto ao ângulo de inclinação (cateto na vertical) em relação à medida do cateto adjacente a esse ângulo (cateto na horizontal), em um triângulo retângulo associado a esse telhado.



$\alpha$	$\text{sen } \alpha$	$\text{cos } \alpha$	$\text{tg } \alpha$
$5^\circ$	0,08716	0,99619	0,08749
$5,5^\circ$	0,09585	0,99540	0,09629
$6^\circ$	0,10453	0,99452	0,10510
$9^\circ$	0,15643	0,98769	0,15838
$9,5^\circ$	0,16505	0,98629	0,16734
$18^\circ$	0,30902	0,95106	0,32492

Figura 9

É correto concluir que, em um telhado com 9,5% de inclinação, o ângulo  $\alpha$  está entre quais valores da tabela?

**Exercício 18.** Demonstre que a área  $S$  do  $\triangle ABC$  (figura 10) pode ser calculada pela fórmula  $S = \frac{b \cdot c \cdot \text{sen } \alpha}{2}$ .




Figura 10

**Exercício 19.** No  $\triangle ABC$  temos que  $AB = \sqrt{2} \text{ cm}$ ,  $AC = 6 \text{ cm}$  e  $\hat{BAC} = 45^\circ$ . Qual o valor da sua área?

**Exercício 20.** Percorrendo, ao longo de uma reta horizontal, a distância  $d = AB$ , em direção à base inacessível de um poste  $CD$ , nota-se (com o auxílio de um teodolito) que os ângulos  $\hat{CAD}$  e  $\hat{CBD}$  medem, respectivamente,  $\alpha$  e  $\beta$  graus. Qual é a altura do poste  $CD$ ?

**Exercício 21.** No triângulo da figura 12, qual a razão entre as áreas  $S_1$  e  $S_2$ ?




Figura 12

**Exercício 22.** Um enigma interessante ocorre quando movimentamos as “peças” da figura 13 e criamos a figura 14. Com as mesmas peças reordenadas, surge um quadradinho vazio na base. Explique esse fato.




Figura 13




Figura 14

**Exercício 23.** A Torre Eiffel tem 324 m da altura (contando com a antena), e deseja-se fotografá-la completamente usando uma câmera com lente de abertura de  $40^\circ$ . Qual a mínima distância da torre (no plano da sua base) para que uma foto com essa câmera capture a torre inteira, como ilustra a figura 15? (Dados na tabela 2.)




Figura 15

**Exercício 24.** Na figura 17, temos o  $\triangle ABC$  com a altura  $AH = 1$  cm.




Figura 17

Sendo assim, calcule:

- em função do ângulo  $\alpha$ , o valor de  $AB$ .
- em função do ângulo  $\alpha$ , o valor de  $HB$ .
- em função do ângulo  $\beta$ , o valor de  $AC$ .
- em função do ângulo  $\beta$ , o valor de  $HC$ .
- a área de  $\triangle ABC$ , em função de  $BC$  e da altura  $AH$ .
- a área de  $\triangle ABC$ , utilizando a fórmula do exercício 18.
- uma fórmula para o  $\sin(\alpha + \beta)$  a partir dos resultados dos itens e e f.

**Exercício 25.** A partir da análise da figura 18, demonstre que  $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$ .




Figura 18

### 3 Exercícios de Aprofundamento e de Exames

**Exercício 26.** Num triângulo retângulo a hipotenusa mede 13 cm e um dos catetos mede 5 cm. A soma das tangentes dos ângulos agudos é aproximadamente:

- 1.
- 1,3.
- 2.
- 2,5.
- 2,8.

**Exercício 27.** Para calcular a altura de um morro, um topógrafo posicionou-se com seu teodolito a 200 m do morro e o aparelho forneceu a medida do ângulo de visada do morro:  $30^\circ$ . O topógrafo, olhando numa tabela, considerou  $\text{tg } 30^\circ = 0,57$ . Se a altura do teodolito é 1,60 m, qual é a altura, em metros, do morro obtida pelo topógrafo?

- 352,48.
- 125,60.
- 118,20.
- 115,60.
- 114.

**Exercício 28.** Na figura 20, estão assinalados três ângulos retos, e três ângulos de medida  $\alpha$ . Sendo  $AB = 1$  e  $BC = 5$ , determine o valor de  $\cos \alpha$ .




Figura 20

- $\frac{\sqrt{3}}{2}$ .
- $\frac{1}{\sqrt[3]{5}}$ .
- $\frac{1}{\sqrt{5}}$ .
- $\sqrt[3]{5}$ .
- $\frac{1}{5}$ .

**Exercício 29.** Um avião voava a uma altitude e velocidade constantes. Num certo instante, quando estava a 8 km de distância de um ponto  $P$ , no solo, ele podia ser visto sob um ângulo de elevação de  $60^\circ$  e, dois minutos mais tarde, esse ângulo passou a valer  $30^\circ$ , conforme a figura 21. A velocidade, em km/h, desse avião era de:




Figura 21

- 180.
- 240.
- 120.
- 150.
- 200.

**Exercício 30.** Prove que:

- a)  $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$ .  
 b)  $\sin x = 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)$ .  
 c)  $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ .  
 d)  $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ .  
 e)  $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$ .  
 f)  $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$ .  
 g)  $\sin(2x) = 1 - 2\sin^2 x$ .  
 h)  $\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\frac{\cos x + 1}{2}}$ .

**Exercício 31.** Seja  $0 < x < 90^\circ$  tal que

$$(1 + \operatorname{tg}^2 x) \cos x = 2.$$

Qual o valor de  $\cos(2x)$ ?

**Exercício 32.** Utilizando as fórmulas de somas de arcos, prove que:

- a)  $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{tg} \beta}$ .  
 b)  $(1 + \operatorname{tg} 1^\circ)(1 + \operatorname{tg} 44^\circ) = 2$ .  
 c) se  $\alpha + \beta = 45^\circ$ , então  $(1 + \operatorname{tg} \alpha^\circ)(1 + \operatorname{tg} \beta^\circ) = 2$ .  
 d)  $(1 + \operatorname{tg} 1^\circ)(1 + \operatorname{tg} 2^\circ) \dots (1 + \operatorname{tg} 44^\circ)$  é quadrado perfeito.

**Exercício 33.** Faça o que se pede.

- a) Calcule uma expressão equivalente a

$$\frac{\operatorname{sen} 1^\circ}{\cos k^\circ \cdot \cos(k+1)^\circ}$$

- b) Prove que

$$\frac{\operatorname{sen} 1^\circ}{\cos 0^\circ \cdot \cos 1^\circ} + \frac{\operatorname{sen} 1^\circ}{\cos 1^\circ \cdot \cos 2^\circ} + \dots + \frac{\operatorname{sen} 1^\circ}{\cos 2014^\circ \cdot \cos 2015^\circ}$$

é igual a  $\operatorname{tg} 2015^\circ$ .

**Exercício 34.** Resolva os itens abaixo:

- a) Prove que  $(\operatorname{sen} 1^\circ) \cdot (\operatorname{sen} 89^\circ) = \frac{(\operatorname{sen} 2^\circ)}{2}$ .  
 b) Prove que  $(\operatorname{sen} 2^\circ) \cdot (\operatorname{sen} 88^\circ) = \frac{(\operatorname{sen} 4^\circ)}{2}$ .  
 c) Sabendo que

$$(\operatorname{sen} 1^\circ)(\operatorname{sen} 3^\circ)(\operatorname{sen} 5^\circ) \dots (\operatorname{sen} 87^\circ)(\operatorname{sen} 89^\circ) = \frac{1}{2^n},$$

qual o valor de  $n$ ?

**Exercício 35.** Leia as proposições abaixo e depois desenvolva o que se pede.

**Proposição 1.** Para o  $\triangle ABC$ , com ceviana<sup>4</sup>  $BD$ , vale que:

$$\frac{(ABD)}{(CBD)} = \frac{AD}{CD},$$

onde  $(ABD)$  e  $(CBD)$  representam as áreas de  $\triangle ABD$  e  $\triangle CBD$ .

Para ver isso, basta usar que a área de um triângulo é o semiproduto da área da base pela sua altura correspondente.

**Proposição 2.** Para o  $\triangle ABC$ , bissetriz  $BD$ ,  $D \in AC$ , é válido que

$$\frac{AD}{AB} = \frac{DC}{CB}.$$

Desenvolva uma demonstração da proposição 2 utilizando a proposição 1 e a fórmula demonstrada no exercício 18.

**Exercício 36.** A partir do triângulo da figura 24 calcule:

- a)  $\sin 18^\circ$  e  $\cos 18^\circ$ .  
 b)  $\sin 72^\circ$  e  $\cos 72^\circ$ .  
 c)  $\sin 36^\circ$  e  $\cos 36^\circ$ .  
 d)  $\sin 54^\circ$  e  $\cos 54^\circ$ .




Figura 24

**Exercício 37.** A partir das fórmulas do cosseno da soma e do cosseno da diferença, prove que:

- a)  $\cos(a+b) - \cos(a-b) = 2 \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b$ .  
 b)  $\cos 1^\circ - \cos 45^\circ = 2 \cdot \operatorname{sen} 23^\circ \cdot \operatorname{sen} 22^\circ$ .  
 c)  $1 - \operatorname{cotg} 23^\circ = \frac{2}{1 - \operatorname{cotg} 22^\circ}$ .

**Exercício 38.** No retângulo  $ABCD$ , com um ponto  $E$  em  $AB$ , um ponto  $F$  em  $BC$ ,  $DF = 1$  u.c., sendo  $D\hat{E}F$  reto,  $A\hat{D}E = \alpha$  e  $E\hat{D}F = \beta$ , calcule.

- a) Qual ângulo representa  $\alpha + \beta$ ?

<sup>4</sup>**Ceviana** é qualquer segmento de reta num triângulo com uma extremidade no vértice do triângulo e a outra extremidade no lado oposto, no caso  $D \in AC$ .

b) Desenvolva outra demonstração para o  $\cos(\alpha + \beta)$ ?

**Exercício 39.** O retângulo  $ABCD$  foi dividido em três quadrados de lado  $1\text{ cm}$ . Prove que

$$B\hat{H}C = B\hat{D}C + B\hat{G}C.$$




Figura 28

**Exercício 40.**

a) Prove que  $\text{sen}(2x) = \frac{2\text{tg}x}{1 + \text{tg}^2x}$ .

b) Prove que  $\text{cos}x = \frac{1 - \text{tg}^2x}{1 + \text{tg}^2x}$ .

c) Se  $\text{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$  é um número racional ( $\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ), prove que  $\text{cos}\alpha$  e  $\text{sen}\alpha$  são números racionais.

d) Prove que  $\text{tg}x = \text{cosec}(2x) - \text{cotg}(2x)$ .

e) Reciprocamente, se  $\text{cos}\alpha$  e  $\text{sen}\alpha$  são números racionais, prove que  $\text{tg}\left(\frac{\alpha}{2}\right)$  é número racional.

**Exercício 41.** Um holofote está situado no ponto  $A$ , a 30 metros de altura, no alto de uma torre perpendicular ao plano do chão. Ele ilumina, em movimento de vaivém, uma parte desse chão, do ponto  $C$  ao ponto  $D$ , alinhados à base  $B$ , conforme demonstra a figura 30 abaixo:




Figura 30

Se o ponto  $B$  dista 20 metros de  $C$  e 150 metros de  $D$ , a medida do ângulo  $C\hat{A}D$  corresponde a:

- a)  $60^\circ$       b)  $45^\circ$       c)  $30^\circ$       d)  $15^\circ$

**Exercício 42.** Sendo  $\text{sen}x + \text{cos}x = \sqrt{2}$ , qual o valor de  $\text{sen}(2x)$ ?

**Exercício 43.** A partir da figura 31, deduza as fórmulas

a)  $\text{sen}(\alpha - \beta) = \text{sen}\alpha \text{cos}\beta - \text{sen}\beta \text{cos}\alpha$ ; e

b)  $\text{cos}(\alpha - \beta) = \text{cos}\alpha \text{cos}\beta + \text{sen}\alpha \text{sen}\beta$ .




Figura 31

**Exercício 44.** Sendo  $x$  e  $y$  números reais tais que

$$(x + 5)^2 + (y - 12)^2 = 14.$$

Qual o valor mínimo de  $x^2 + y^2$ ?

- a) 2.      b) 1.      c)  $\sqrt{3}$ .      d)  $\sqrt{2}$ .

**Exercício 45.** Usando as fórmulas das questões 24 e 25, resolva os itens a seguir.

a) Verifique que  $(1 + \text{tg}k)(1 + \text{tg}(45^\circ - k)) = 2$ .

b) Dado que

$$(1 + \text{tg}1^\circ)(1 + \text{tg}2^\circ) \cdot \dots \cdot (1 + \text{tg}45^\circ) = 2^n,$$

calcule  $n$ .

## Respostas e Soluções.

**Observação:** Neste módulo, serão estudadas as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Aplicaremos os conceitos de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa para definir os senos, cossenos e tangentes de cada ângulo. No geral, fazendo uso das marcações no triângulo da figura 1, teremos:




Figura 1

- i) os catetos são  $b$  e  $c$  e a hipotenusa é  $a$ ;
- ii) em relação ao ângulo  $\alpha$ , teremos  $c$  como cateto oposto e  $b$  como cateto adjacente (o inverso para  $\beta$ );
- iii) definiremos o  $\text{sen } \alpha = \frac{c}{a}$  e o  $\text{sen } \beta = \frac{b}{a}$ ;
- iv) definiremos o  $\text{cos } \alpha = \frac{b}{a}$  e o  $\text{cos } \beta = \frac{c}{a}$ ; e
- v) definiremos a  $\text{tg } \alpha = \frac{c}{b}$  e  $\text{tg } \beta = \frac{b}{c}$ .

O que permite concluir que quando  $\alpha$  e  $\beta$  forem complementares, isto é,

$$\alpha + \beta = 90^\circ,$$

teremos  $\text{sen } \alpha = \text{cos } \beta$  e  $\text{sen } \beta = \text{cos } \alpha$ . Usando as substituições adequadas concluimos que  $\text{tg } \alpha = \frac{\text{sen } \alpha}{\text{cos } \alpha}$  e  $\text{tg } \beta = \frac{\text{sen } \beta}{\text{cos } \beta}$ . Além disso, aplicando o Teorema de Pitágoras, poderemos concluir para ângulos agudos que

$$\text{sen}^2 \alpha + \text{cos}^2 \alpha = 1.$$

A última equação é denominada “**Relação Fundamental**” e é válida para qualquer ângulo, não necessariamente o agudo. Outras funções trigonométricas importantes são  $\text{cotg } \alpha = \frac{1}{\text{tg } \alpha}$ ,  $\text{sec } \alpha = \frac{1}{\text{cos } \alpha}$  e  $\text{cosec } \alpha = \frac{1}{\text{sen } \alpha}$ .

1. Observe que todos os ternos satisfazem a Recíproca do Teorema de Pitágoras, portanto, todos poderiam ser lados em triângulos retângulos. Os dois números menores representariam as medidas dos catetos e o maior número, a medida da hipotenusa.

2. Em cada um dos triângulos retângulos da questão anterior há dois ângulos agudos. Definindo o  $\text{sen } i = \frac{\text{Cateto Oposto } i}{\text{Hipotenusa}}$ ,  $i \in \{1, 2\}$ , e calculando os respectivos valores, obtemos os resultados aproximados da tabela 1.

Tabela 1: Senos, cossenos e tangentes.

Cateto 1	Cateto 2	Hipotenusa	Senos 1	Senos 2
5	12	13	0,385	0,923
8	15	17	0,471	0,882
7	24	25	0,280	0,960
12	35	37	0,324	0,946
11	60	61	0,180	0,984
20	21	29	0,690	0,724
9	40	41	0,220	0,976

Portanto, o maior seno é  $\frac{60}{61} \cong 0,984$ .

3. Observe que os lados do triângulo verificam a recíproca do “Teorema de Pitágoras”, ou seja,

$$6^2 + 8^2 = 10^2.$$

Portanto, esse triângulo é retângulo com hipotenusa 10, com um dos seus ângulos agudos tendo seno igual a  $\frac{6}{10}$ , cosseno igual a  $\frac{8}{10}$ , tangente igual a  $\frac{6}{8}$ . O outro possui seno igual a  $\frac{8}{10}$ , cosseno igual a  $\frac{6}{10}$  e tangente igual a  $\frac{8}{6}$ .

4. Pela Recíproca do Teorema de Pitágoras, temos que ambos são triângulos retângulos, pois,

$$3^2 + 4^2 = 5^2 \text{ e } 9^2 + 12^2 = 15^2.$$

No primeiro triângulo, um dos ângulos agudos ( $\alpha_1$ ) tem seno igual a  $\frac{3}{5}$ , cosseno igual a  $\frac{4}{5}$  e tangente igual a  $\frac{3}{4}$  e o outro ( $\beta_1$ ) possui seno igual a  $\frac{4}{5}$ , cosseno igual a  $\frac{3}{5}$  e tangente igual a  $\frac{4}{3}$ . Já no segundo, teremos os mesmos valores de senos, cossenos e tangentes para  $\alpha_2$  e  $\beta_2$ , respectivamente. Portanto, nos dois triângulos teremos ângulos retos,  $\alpha_1 = \alpha_2$  e  $\beta_1 = \beta_2$ .

5. Retirando os dados da tabela 2, obtemos:

a) Como  $\text{sen } 57^\circ = 0,84 = \frac{x}{100}$ , temos  $x = 84$ ;



- b) Como  $\cos 80^\circ = 0,17 = \frac{x}{200}$ , temos  $x = 34$ ;
- c) Como  $\operatorname{tg} 20^\circ = 0,36 = \frac{x}{300}$  temos  $x = 108$ . Além disso, como  $\operatorname{tg} 40^\circ = 0,84 = \frac{y}{300}$  temos  $y = 252$ . Portanto,  $BD = 360$ ;
- d) Observe que  $\triangle DBC$  é isósceles de base  $BC$ , pois  $\widehat{DCA} = 15^\circ$ , então  $CD = DA = 400$  cm. Sendo  $BC = x$  e aplicando que  $\operatorname{sen} 30^\circ = \frac{x}{400}$  concluiremos que  $x = 200$  cm;
- e) Sejam  $\alpha$  e  $\beta$  os ângulos opostos ao maior e menor catetos, respectivamente. Fazendo  $\operatorname{tg} \beta = \frac{34}{93} \cong 0,37$ , encontraremos, pela tabela 2, que  $\beta \cong 20^\circ$ ;
- f) Sejam  $\alpha$  e  $\beta$  os ângulos opostos ao maior e menor catetos, respectivamente. Se fizermos a  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{97}{26} \cong 3,73$ , encontramos um valor fora da tabela 2. Contudo, para  $\operatorname{tg} \beta = \frac{26}{97} \cong 0,27$ . Temos,  $\beta \cong 15^\circ$  e, portanto,  $\alpha \cong 75^\circ$ ; e
- g) Como  $\operatorname{sen} 30^\circ = \frac{1}{2}$ , concluímos que o cateto oposto é metade da hipotenusa.

**6.** (Adaptado da Vídeo Aula)

Inicialmente devemos calcular o valor da hipotenusa  $x$  utilizando o Teorema de Pitágoras.

$$x^2 = 3^2 + 4^2$$

$$x^2 = 25$$

$$x = 5$$

Então,  $\operatorname{sen} \alpha = \cos \beta = \frac{3}{5}$ ,  $\cos \alpha = \operatorname{sen} \beta = \frac{4}{5}$ ,  
 $\operatorname{tg} \alpha = \frac{3}{4}$  e  $\operatorname{tg} \beta = \frac{4}{3}$ .

**Comentário para professores:** Na resolução da equação  $x^2 = 25$  só foi destacada a sua raiz positiva, pois  $x$  representa a medida da hipotenusa.

**7.** Pela relação fundamental da trigonometria, temos que  $(0,6)^2 + \cos^2 \alpha = 1$ . Daí,  $\cos \alpha = 0,8$  e

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} = \frac{0,6}{0,8} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

**8.** Podemos dividir a relação por  $\cos^2 x \neq 0$ , obtendo

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x &= 1 \\ \frac{\operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} + \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} &= \frac{1}{\cos^2 x} \\ \operatorname{tg}^2 x + 1 &= \operatorname{sec}^2 x \end{aligned}$$

**9.** (Adaptado da Vídeo Aula)

Na figura 4 podemos destacar o triângulo  $BHC$ , retângulo em  $H$ , e aplicar o Teorema de Pitágoras.

$$2^2 = 1^2 + h^2$$

$$h^2 = 3$$

$$h = \sqrt{3}$$




Figura 4

No mesmo triângulo, o ângulo de  $60^\circ$  terá cateto oposto igual a  $\sqrt{3}$ , cateto adjacente 1 e hipotenusa 2. Portanto  $\operatorname{sen} 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$  e  $\operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$ , o que responde o item a). Como  $60^\circ$  e  $30^\circ$  são complementares, teremos:

i)  $\operatorname{sen} 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ;

ii)  $\operatorname{sen} 30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ ; e

iii)  $\operatorname{tg} 60^\circ \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = 1$ . Assim,  $\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ .

**10.** Seja  $ABCD$  o quadrado de lado 1 cm, pelo Teorema de Pitágoras, a sua diagonal medirá  $\sqrt{2}$  cm e  $\widehat{BCD} = 45^\circ$  (figura 5).




Figura 5

Portanto,

$$\text{i) } \operatorname{sen} 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{ii) } \operatorname{cos} 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\text{iii) } \operatorname{tg} 45^\circ = \frac{1}{1} = 1.$$

**Comentário para professores:** Nos problemas 9 e 10 utilizamos triângulo e quadrado com comprimentos particulares de lados. A análise geral do problema (feita no vídeo), com lado medindo  $\ell$ , pode ser tratada de modo análogo. Por hora, chegamos à tabela 3 dos senos, cossenos e tangentes dos arcos notáveis  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  e  $60^\circ$ .

Tabela 3:  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  e  $60^\circ$ .

Arco	sen	cos	tg
$30^\circ$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
$45^\circ$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
$60^\circ$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

11. Observando que  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\operatorname{cos} \alpha}$  teremos que

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} \alpha \cdot \operatorname{cos} \alpha \cdot \operatorname{tg} \alpha &= \operatorname{sen} \alpha \cdot \operatorname{cos} \alpha \cdot \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\operatorname{cos} \alpha} \\ &= \operatorname{sen}^2 \alpha \end{aligned}$$

12. A rampa deve ser vista como a hipotenusa de um triângulo retângulo e a altura  $h$  será o cateto oposto ao ângulo de  $30^\circ$ . Então usaremos o  $\operatorname{sen} 30^\circ = \frac{h}{6}$ . Assim,  $h = 3$  m ou 300 cm. Para a quantidade de degraus, basta dividirmos 300 por 25 obtendo 12 degraus.

13. (Extraído do material do IMPA/PAPMEM.)




Figura 6

Sejam  $h$  a altura do Pão de Açúcar e  $x$  a distância de  $B$  ao pé da altura (figura 6). Então, teremos que

$$\operatorname{tg} 14^\circ = \frac{h}{x} = 0,2493 \text{ e } \operatorname{tg} 10^\circ = \frac{h}{650 + x} = 0,1763.$$

Após resolver o sistema, chegaremos a  $h = 391,4$ .

**Comentário para professores:**

Um dos instrumentos de medida usuais, baseado nas funções trigonométricas, é o teodolito (figura 7), que faz medidas de ângulos com imensa precisão na vertical e na horizontal<sup>1</sup>.




Figura 7: Teodolito.

<sup>1</sup>Imagem: Capítulo 4, ensinomedio.impa.br, acesso em 2004.

14.

a) (Adaptado do vestibular do IFSP/2014)

Sejam  $c$  o comprimento da escada e  $A'$  a projeção de  $A$  em  $CD$ . Como o alcance da escada é de 54 metros, teremos  $A'C = 52$  m. Usando que  $\sin 60^\circ = \frac{52}{c}$ , então

$$c = \frac{104}{\sqrt{3}} = \frac{104\sqrt{3}}{3} \text{ m.}$$

b) Com a perda de 25% o novo ângulo será  $0,75 \cdot 60^\circ = 45^\circ$ . A nova altura máxima será  $h' + 2$ , com  $A'C' = h'$ , definindo  $C'$  como o ponto onde a escada toca o prédio.

Fazendo  $\sin 45^\circ = \frac{h'}{104}$ , temos  $h' + 2 = \frac{52\sqrt{6} + 6}{3}$  m.

15. Desenvolvendo a equação inicial, destacando que  $\cos x \neq 0$ , chegamos a

$$\begin{aligned} \sec x - \tan x &= 1 \\ \frac{1}{\cos x} - \frac{\sin x}{\cos x} &= 1 \\ 1 - \sin x &= \cos x \end{aligned}$$

Substituindo na relação fundamental teremos

$$\begin{aligned} \sin^2 x + \cos^2 x &= 1 \\ \sin^2 x + (1 - \sin x)^2 &= 1 \\ 2\sin^2 x - 2\sin x &= 0 \\ \sin x(2\sin x - 2) &= 0 \end{aligned}$$

Donde,  $\sin x = 0$  (com  $\cos x = 1$ ) ou  $\sin x = 1$ , e apenas o primeiro serve, pois para o segundo teríamos  $\cos x = 0$ , **absurdo**. Por fim,  $\sec x = 1$  e  $\operatorname{tg} x = 0$ . Portanto

$$\sec x + \operatorname{tg} x = 1.$$

16. Elevando as duas equações ao quadrado, chegaremos a:

$$\begin{aligned} 3 \sin A + 4 \cos B &= 6 \\ (3 \sin A + 4 \cos B)^2 &= 6^2 \\ 9 \sin^2 A + 24 \sin A \cos B + 16 \cos^2 B &= 36 \end{aligned} \quad (1)$$

e

$$\begin{aligned} 4 \sin B + 3 \cos A &= 1 \\ (4 \sin B + 3 \cos A)^2 &= 1^2 \\ 16 \sin^2 B + 24 \sin B \cos A + 9 \cos^2 A &= 1. \end{aligned} \quad (2)$$

Somando (1) com (2), teremos

$$\begin{aligned} 16 + 24 \sin A \cos B + 24 \sin B \cos A + 9 &= 36 + 1 \\ 25 + 24(\sin A \cos B + \sin B \cos A) &= 36 + 1 \\ 24(\sin A \cos B + \sin B \cos A) &= 12 \\ \sin(A + B) &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Logo,  $A + B = 30^\circ$  e então  $C = 150^\circ$ .

17. (Extraído do vestibular do Centro Universitário São Camilo SP/2014)

A inclinação do telhado é determinada pela tangente de  $\alpha$ . Sendo assim,  $\operatorname{tg} \alpha = 9,5\% = 0,095$ , o que resulta em  $5^\circ < \alpha < 5,5^\circ$ .

18. A partir da altura  $BH = h$  relativa à  $AC$ , temos  $\sin \alpha = \frac{h}{c}$  e  $h = c \cdot \sin \alpha$  (figura 11).




Figura 11

Por fim, como a base  $AC = b$ ,  $S = \frac{bh}{2} = \frac{b \cdot c \cdot \sin \alpha}{2}$ . ■

$$19. S_{ABC} = \frac{\sqrt{2} \cdot 6 \cdot \sin 45^\circ}{2} = 3 \text{ cm}^2.$$

20. Temos  $CD = AC \cdot \operatorname{tg} \alpha = BC \cdot \operatorname{tg} \beta$ . Como  $AC = BC + d$ , vem  $(BC + d) \cdot \operatorname{tg} \alpha = BC \cdot \operatorname{tg} \beta$ . Daí,

$$BC = d \cdot \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}$$

e

$$CD = BC \cdot \operatorname{tg} \beta = d \cdot \frac{\operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}.$$

21. Seja  $S$  a área do  $\triangle ABC$ , então  $S_2 = S - S_1$ . Tomando como base o ângulo  $\widehat{ABC} = \beta$ , teremos que:

$$\begin{aligned} S &= \frac{12 \cdot 15 \cdot \sin \beta}{2}; \\ S_1 &= \frac{10 \cdot 9 \cdot \sin \beta}{2}; \text{ e} \\ S_2 &= \frac{12 \cdot 15 \cdot \sin \beta}{2} - \frac{10 \cdot 9 \cdot \sin \beta}{2}. \end{aligned}$$

Daí, obtemos que

$$\begin{aligned} \frac{S_1}{S_2} &= \frac{\frac{10 \cdot 9 \cdot \sin \beta}{2}}{\frac{12 \cdot 15 \cdot \sin \beta}{2} - \frac{10 \cdot 9 \cdot \sin \beta}{2}} \\ &= 1. \end{aligned}$$

Ou seja, podemos concluir que  $S_1 = S_2$ .

22. A justaposição das figuras não geram os triângulos retângulos maiores que aparentam estar no desenho<sup>2</sup>. No triângulo menor, temos que o ângulo agudo da base tem  $\operatorname{tg} \alpha_1 = \frac{2}{5}$  e no maior,  $\operatorname{tg} \alpha_2 = \frac{3}{8}$ . Logo, a figura 13 não é um triângulo (nem a figura 14), por isso, na reorganização, surge um quadradinho branco. Após a movimentação, a suposta “hipotenusa” da figura grande muda levemente a curvatura, avançando a diferença de 1 quadradinho que surge.

23. (Extraído do Geogebra.org)




Figura 16

Usando que  $\operatorname{tg} 40^\circ = \frac{324}{x}$ , obteremos que  $x \cong 385,72$  metros. (a aproximação foi para “cima”, se a fizéssemos para baixo poderíamos perder parte da antena da torre).

24.

a)  $\cos \alpha = \frac{1}{AB} \Rightarrow AB = \frac{1}{\cos \alpha}$ .

b)  $\operatorname{sen} \alpha = \frac{HB}{AB} \Rightarrow HB = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}$ .

c)  $\cos \beta = \frac{1}{AC} \Rightarrow AC = \frac{1}{\cos \beta}$ .

d)  $\operatorname{sen} \beta = \frac{HC}{AC} \Rightarrow HC = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha}$ .

e)  $S_{\triangle ABC} = \frac{BC \cdot AH}{2} = \frac{\frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\operatorname{sen} \beta}{\cos \beta}}{2}$ .

f)  $S_{\triangle ABC} = \frac{AB \cdot AC \cdot \operatorname{sen}(\alpha + \beta)}{2} = \frac{\operatorname{sen}(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta}$ .

<sup>2</sup>Tal ilusão é conhecida como o “Paradoxo do quadrado perdido”

g) Pelos itens e e f teremos que

$$\frac{\operatorname{sen}(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cdot \cos \beta} = \frac{\operatorname{sen} \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\operatorname{sen} \beta}{\cos \beta}$$

$$\operatorname{sen}(\alpha + \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cos \beta + \operatorname{sen} \beta \cos \alpha.$$

25. Sendo  $E$  a interseção de  $AF$  com  $BD$ , temos que:

- i)  $AB = \cos(\alpha + \beta)$ ;
- ii)  $DG = \operatorname{sen} \beta$ ;
- iii)  $AG = \cos \beta$ ;
- iv)  $EG = \operatorname{sen} \beta \cdot \operatorname{tg} \alpha$ ;
- v)  $AE = \cos \beta - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta$ ;
- vi)  $BE = \cos(\alpha + \beta) \cdot \operatorname{tg} \alpha$ ; e
- vii)  $ED = \frac{\operatorname{sen} \beta}{\cos \alpha}$ .

Perceba que  $\triangle ABD$  e  $\triangle AGD$  podem ser inscritos na mesma semicircunferência<sup>3</sup> (figura 19).




Figura 19

Podemos aplicar a potência do ponto  $E$  fazendo

$$AE \cdot EG = DE \cdot EB$$

$$(\cos \beta - \operatorname{tg} \alpha \cdot \operatorname{sen} \beta) \cdot \operatorname{sen} \beta \cdot \operatorname{tg} \alpha = \cos(\alpha + \beta) \cdot \operatorname{tg} \alpha \cdot \frac{\operatorname{sen} \beta}{\cos \alpha}$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta$$

■

**Observação:**  $\operatorname{sen}(-\alpha) = -\operatorname{sen}(\alpha)$  e  $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$ , por definição. Daí,  $\operatorname{sen}(\alpha - \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cos \beta - \operatorname{sen} \beta \cos \alpha$  e  $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta$ . Essas fórmulas serão demonstradas, para ângulos agudos, na questão 43.

<sup>3</sup> $ABGD$  é quadrilátero inscrito

**26.** (Extraído do exame do PROFMAT/2014)  
Como a hipotenusa mede 13 e um dos catetos mede 5, pelo Teorema de Pitágoras, o outro cateto mede 12. Os ângulos agudos terão tangentes iguais a  $\frac{5}{12}$  e  $\frac{12}{5}$ . Portanto,  $\frac{5}{12} + \frac{12}{5} \cong 2,8$  e a resposta é letra **E**.

**27.** (Extraído do exame do PROFMAT/2014)  
Seja  $x$  o cateto oposto a  $30^\circ$ . Então  $\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{x}{200} = 0,57$ . Logo,  $x = 114$  m e a altura do morro é de  $x = 114 + 1,6 = 115,6$  m. Portanto, resposta é letra **D**.

**28.** (Extraído do exame do PROFMAT/2014)  
Sejam  $BD = y$  e  $BE = x$ . Portanto, no  $\triangle BDC$ , temos que  $\cos \alpha = \frac{y}{5}$ . Analisando agora o  $\triangle BED$ , temos  $\cos \alpha = \frac{x}{y}$  e, finalmente, no  $\triangle BAE$ , temos  $\cos \alpha = \frac{1}{x}$ . Resolvendo esse sistema, teremos que  $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt[3]{5}}$  e, portanto, a resposta é a letra **B**.

**29.** (Extraído do vestibular da ESPM/2014)  
Sejam  $r$  e  $s$  as retas representadas da figura 21, onde  $s$  é a tracejada. Denomine a projeção de  $A$  na reta  $r$  como o  $B$ . Então,  $\cos 60^\circ = \frac{PB}{8}$  e  $\sin 60^\circ = \frac{AB}{8}$ . Portanto,  $AB = 4\sqrt{3}$  km e  $PB = 4$  km. Chame de  $B'$  a projeção de  $A'$  na reta  $r$ . Perceba que  $AB = A'B' = 4\sqrt{3}$  km. Consequentemente,  $\operatorname{tg} 30^\circ = \frac{4\sqrt{3}}{PB'}$ , isto é,  $PB' = 12$  km. Por fim,  $AA' = 8$  km. Como o avião percorreu essa distância em dois minutos, em uma hora iria percorrer  $8 \cdot 30 = 240$  km. Assim, a resposta é a letra **B**.

**30.** Usaremos que  $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha$ .

a) Sendo  $\alpha = \beta = x$  teremos

$$\begin{aligned}\sin(x+x) &= \sin x \cos x + \sin x \cos x \\ \sin(2x) &= 2 \sin x \cos x\end{aligned}$$

b) Sendo  $\alpha = \beta = \frac{x}{2}$  teremos

$$\begin{aligned}\sin\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\right) &= \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) + \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right) \\ \sin(x) &= 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)\end{aligned}$$

c) A partir da relação fundamental da trigonometria, temos

$$\begin{aligned}\sin^2 x + \cos^2 x &= 1 \\ \sin^2 x &= 1 - \cos^2 x\end{aligned}$$

d) Análogo ao anterior.

e) Sendo  $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$  e tomando  $\alpha = \beta = x$  teremos  $\cos(x+x) = \cos x \cos x - \sin x \sin x$  que é o mesmo que  $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$ . ■

f) Aplicando c em e, temos o que foi pedido. ■

g) Análogo ao anterior.

h) Essa é uma rearrumação da fórmula do do item f.

**31.** (Adaptado da Olimpíada de Matemática do RJ)

$$\begin{aligned}(1 + \operatorname{tg}^2 x) \cos x &= 2 \\ \sec^2 x \cdot \cos x &= 2 \\ \cos x &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Sendo  $0 < x < 90^\circ$ , temos  $x = 60^\circ$ . Por fim, como  $\cos(2x) = 2\cos^2 x - 1$ , obteremos

$$\cos(120^\circ) = 2\cos^2 60^\circ - 1 = -\frac{1}{2}.$$

**32.** Para resolver essa questão, utilizaremos as fórmulas:

- $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha$ ; e
- $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$

a) Podemos fazer

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}(\alpha + \beta) &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} \\ &= \frac{\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta} \\ &= \frac{\sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha}{\cos \alpha \cos \beta} \\ &= \frac{\cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta} \\ &= \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}\end{aligned}$$

b) Observe que

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}(1^\circ + 44^\circ) &= \operatorname{tg} 45^\circ \\ \frac{\operatorname{tg} 1^\circ + \operatorname{tg} 44^\circ}{1 - \operatorname{tg} 1^\circ \cdot \operatorname{tg} 44^\circ} &= 1 \\ 1 - \operatorname{tg} 1^\circ \cdot \operatorname{tg} 44^\circ &= \operatorname{tg} 1^\circ + \operatorname{tg} 44^\circ \\ \operatorname{tg} 1^\circ + \operatorname{tg} 44^\circ + \operatorname{tg} 1^\circ \cdot \operatorname{tg} 44^\circ &= 1 \\ 1 + \operatorname{tg} 1^\circ + \operatorname{tg} 44^\circ + \operatorname{tg} 1^\circ \cdot \operatorname{tg} 44^\circ &= 2 \\ (1 + \operatorname{tg} 1^\circ) + \operatorname{tg} 44^\circ(1 + \operatorname{tg} 1^\circ) &= 2 \\ (1 + \operatorname{tg} 1^\circ)(1 + \operatorname{tg} 44^\circ) &= 2\end{aligned}$$

c) Análogo ao anterior.

d) Usando os itens anteriores concluímos que a expressão é igual a  $2^{22}$ , um quadrado perfeito cuja raiz quadrada é  $2^{11} = 2048$ . ■

**Observação:** Para a  $\text{tg}(\alpha - \beta)$  devemos usar as fórmulas de  $\text{sen}(\alpha - \beta)$  e  $\text{cos}(\alpha - \beta)$  e assim chegaremos a

$$\text{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\text{tg } \alpha - \text{tg } \beta}{1 + \text{tg } \alpha \text{tg } \beta}.$$

**33.** Observe que  $1 = k + 1 - k$ , portanto

a)

$$\begin{aligned} \frac{\text{sen } 1^\circ}{\text{cos } k^\circ \cdot \text{cos}(k+1)^\circ} &= \\ \frac{\text{sen}(k+1-k)^\circ}{\text{cos } k^\circ \cdot \text{cos}(k+1)^\circ} &= \\ \frac{\text{sen}(k+1)^\circ \text{cos } k^\circ - \text{sen } k^\circ \text{cos}(k+1)^\circ}{\text{cos } k^\circ \cdot \text{cos}(k+1)^\circ} &= \\ \frac{\text{sen}(k+1)^\circ \text{cos } k^\circ}{\text{cos } k^\circ \cdot \text{cos}(k+1)^\circ} - \frac{\text{sen } k^\circ \text{cos}(k+1)^\circ}{\text{cos } k^\circ \cdot \text{cos}(k+1)^\circ} &= \\ = \text{tg}(k+1)^\circ - \text{tg } k^\circ. \end{aligned}$$

b) (Adaptado da Olimpíada de Matemática do RJ)  
Utilizando o item a, podemos reescrever a expressão original como

$$\begin{aligned} \text{tg } 1^\circ - \text{tg } 0^\circ + \text{tg } 2^\circ - \text{tg } 1^\circ + \dots \\ \dots + \text{tg } 2015^\circ - \text{tg } 2014^\circ = \text{tg } 2015^\circ. \end{aligned}$$

**34.** Para resolver este item, utilizaremos as fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{sen } \alpha &= \text{cos}(90^\circ - \alpha); \text{ e} \\ \text{sen } 2\alpha &= 2 \text{sen } \alpha \text{cos } \alpha. \end{aligned}$$

a)  $(\text{sen } 1^\circ) \cdot (\text{sen } 89^\circ) = (\text{sen } 1^\circ) \cdot (\text{cos } 1^\circ) = \frac{(\text{sen } 2^\circ)}{2}$ . ■

b)  $(\text{sen } 2^\circ) \cdot (\text{sen } 88^\circ) = (\text{sen } 2^\circ) \cdot (\text{cos } 2^\circ) = \frac{(\text{sen } 4^\circ)}{2}$ . ■

c) (Extraído da Olimpíada de Matemática do RJ)

$$\begin{aligned} &(\text{sen } 1^\circ)(\text{sen } 3^\circ)(\text{sen } 5^\circ) \dots (\text{sen } 87^\circ)(\text{sen } 89^\circ) = \\ &\frac{(\text{sen } 1^\circ)(\text{sen } 3^\circ) \dots (\text{sen } 89^\circ)(\text{sen } 2^\circ)(\text{sen } 4^\circ) \dots (\text{sen } 88^\circ)}{(\text{sen } 2^\circ)(\text{sen } 4^\circ)(\text{sen } 6^\circ) \dots (\text{sen } 86^\circ)(\text{sen } 88^\circ)} = \\ &\frac{(\text{sen } 1^\circ)(\text{sen } 89^\circ)(\text{sen } 2^\circ)(\text{sen } 88^\circ) \dots (\text{sen } 46^\circ)(\text{sen } 45^\circ)}{(\text{sen } 2^\circ)(\text{sen } 4^\circ)(\text{sen } 6^\circ) \dots (\text{sen } 86^\circ)(\text{sen } 88^\circ)} = \\ &\frac{(\text{sen } 1^\circ)(\text{cos } 1^\circ)(\text{sen } 2^\circ)(\text{cos } 2^\circ) \dots (\text{cos } 44^\circ)(\text{sen } 45^\circ)}{(\text{sen } 2^\circ)(\text{sen } 4^\circ)(\text{sen } 6^\circ) \dots (\text{sen } 86^\circ)(\text{sen } 88^\circ)} = \\ &\frac{\left(\frac{\text{sen } 2^\circ}{2}\right) \left(\frac{\text{sen } 4^\circ}{2}\right) \dots \left(\frac{\text{sen } 88^\circ}{2}\right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)}{(\text{sen } 2^\circ)(\text{sen } 4^\circ)(\text{sen } 6^\circ) \dots (\text{sen } 86^\circ)(\text{sen } 88^\circ)} = \\ &\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \dots \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \\ &\frac{1}{2^{44}} \cdot \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}} = \\ &= \frac{1}{2^{\frac{89}{2}}} \end{aligned}$$

Portanto,  $n = 44, 5$ .

**35.** Usando os valores da figura 22, teremos pela proposição 1 que  $\frac{(ABD)}{(CBD)} = \frac{x}{y}$ .




Figura 22

Aplicando o resultado do exercício 18 obtemos

$$\begin{aligned} \frac{cb \cdot \text{sen } \beta}{2} &= \frac{x}{y} \\ \frac{c}{a} &= \frac{x}{y} \\ \frac{AD}{AB} &= \frac{DC}{CB}. \end{aligned}$$

O que demonstra a proposição 2. ■

**Comentário para professores:** A proposição 2 é conhecida também como “Teorema da Bissetriz Interna” ou, pela forma lúdica, “Teorema da Bailarina”. Esse segundo nome deve-se ao truque de memorização usado para lembrar das razões envolvidas em seu enunciado que podem ser associados a um movimento de Balé (figura 23).




Figura 23

Em resumo, num  $\triangle ABC$  com bissetriz  $BD$ ,  $D \in AC$ , como na figura 22, temos que

$$\frac{AD}{AB} = \frac{DC}{CB}.$$

**36.**  $\hat{A}BC = \hat{B}CA = 72^\circ$ , pois  $ABC$  é isósceles de base  $BC$  (figura 25).




Figura 25

A bissetriz do ângulo  $\hat{A}CB$  encontra  $AB$  no ponto  $D$  e separa os triângulos isósceles  $ADC$ , de base  $AC$ , e  $BDC$ , de base  $BD$ . Donde segue que  $CD = AD = BC = x$  e  $BD = 1 - x$  (figura 26).




Figura 26

Pelo Teorema da Bissetriz Interna, teremos

$$\begin{aligned} \frac{x}{1} &= \frac{1-x}{x} \\ x^2 &= 1-x \\ x^2 + x - 1 &= 0 \\ x &= \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

Com  $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ , pois  $x > 0$ . A bissetriz de  $\hat{B}AC$  (que contém as altura e mediana relativas a  $BC$ ) tem interseção com  $BC$  em  $H$ . (figura 27).




Figura 27

No  $\triangle AHB$ , retângulo em  $H$ , teremos que calcular o valor do cateto  $AH = y$ , portanto

$$\begin{aligned} \left(\frac{\sqrt{5}-1}{4}\right)^2 + y^2 &= 1^2 \\ 5 - 2\sqrt{5} + 1 + 16y^2 &= 16 \\ 16y^2 &= 10 + 2\sqrt{5} \\ y &= \frac{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}{4} \end{aligned}$$

Obtemos assim

$$a) \operatorname{sen} 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4} \text{ e } \operatorname{cos} 18^\circ = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4};$$

$$b) \operatorname{sen} 72^\circ = \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4} \text{ e } \operatorname{cos} 72^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}.$$

c) Para  $36^\circ$ , utilizaremos as fórmulas de arco duplo.

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} 36^\circ &= \operatorname{sen}(18^\circ + 18^\circ) \\ &= 2 \operatorname{sen}(18^\circ) \operatorname{cos}(18^\circ) \\ &= 2 \cdot \frac{\sqrt{5}-1}{4} \cdot \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4} \\ &= \frac{\sqrt[4]{20}}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{cos} 36^\circ &= \operatorname{cos}(18^\circ + 18^\circ) \\ &= \operatorname{cos}^2 18^\circ - \operatorname{sen}^2 18^\circ \\ &= \left( \frac{\sqrt{10+2\sqrt{5}}}{4} \right)^2 - \left( \frac{\sqrt{5}-1}{4} \right)^2 \\ &= \frac{10+2\sqrt{5}}{16} - \frac{6-2\sqrt{5}}{16} \\ &= \frac{4\sqrt{5}-2}{16} \\ &= \frac{2\sqrt{5}-1}{8} \end{aligned}$$

$$d) \operatorname{sen} 54^\circ = \frac{2\sqrt{5}-1}{8} \text{ e } \operatorname{cos} 54^\circ = \frac{\sqrt[4]{20}}{4}.$$

**37.**

a) As fórmulas do cosseno da soma e da subtração são

$$\operatorname{cos}(a+b) = \operatorname{cos} a \operatorname{cos} b - \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b \quad (3)$$

$$\operatorname{cos}(a-b) = \operatorname{cos} a \operatorname{cos} b + \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b. \quad (4)$$

Fazendo (4) - (3), teremos

$$\operatorname{cos}(a-b) - \operatorname{cos}(a+b) = 2 \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b$$

b) Usando a fórmula do item a,

$$\operatorname{cos}(a-b) - \operatorname{cos}(a+b) = 2 \operatorname{sen} a \operatorname{sen} b,$$

fazendo  $a-b = 1^\circ$  e  $a+b = 1^\circ$  teremos  $a = 23^\circ$  e  $b = 22^\circ$ , o que demonstra o pedido. ■

c) Provar o solicitado é equivalente a provar que

$$\begin{aligned} (1 - \operatorname{cotg} 23^\circ)(1 - \operatorname{cotg} 22^\circ) &= 2 \\ \left(1 - \frac{\operatorname{cos} 23^\circ}{\operatorname{sen} 23^\circ}\right) \left(1 - \frac{\operatorname{cos} 22^\circ}{\operatorname{sen} 22^\circ}\right) &= \\ \frac{(\operatorname{sen} 23^\circ - \operatorname{cos} 23^\circ)(\operatorname{sen} 22^\circ - \operatorname{cos} 22^\circ)}{\operatorname{sen} 23^\circ \cdot \operatorname{sen} 22^\circ} &= \\ \frac{A-B}{\operatorname{sen} 23^\circ \cdot \operatorname{sen} 22^\circ} &= \end{aligned}$$

com

$$\begin{aligned} A &= \operatorname{cos} 23^\circ \operatorname{cos} 22^\circ + \operatorname{sen} 22^\circ \operatorname{sen} 23^\circ \\ &= \operatorname{cos}(23^\circ - 22^\circ) \\ &= \operatorname{cos} 1^\circ \text{ e} \\ B &= \operatorname{sen} 22^\circ \operatorname{cos} 23^\circ - \operatorname{sen} 23^\circ \operatorname{cos} 22^\circ \\ &= \operatorname{sen}(22^\circ + 23^\circ) \\ &= \operatorname{cos} 45^\circ \end{aligned}$$

pelo item b, teremos

$$\operatorname{sen} 23^\circ \cdot \operatorname{sen} 22^\circ = \frac{\operatorname{cos} 1^\circ - \operatorname{cos} 45^\circ}{2}.$$

Por fim, obtemos

$$\begin{aligned} \frac{A-B}{\operatorname{sen} 23^\circ \cdot \operatorname{sen} 22^\circ} &= \frac{\operatorname{cos} 1^\circ - \operatorname{cos} 45^\circ}{\operatorname{cos} 1^\circ - \operatorname{cos} 45^\circ} \\ &= 2 \end{aligned}$$

**38.**

a) Como  $D\hat{E}A = 90^\circ - \alpha$ ,  $B\hat{E}F = \alpha$  e  $B\hat{F}E = 90^\circ - \alpha$ . De modo análogo,  $D\hat{F}E = 90^\circ - \beta$  e  $D\hat{F}C = \alpha + \beta$ .

b) Temos no:

- i)  $\triangle DEF$ ,  $DE = \operatorname{cos} \beta$  e  $EF = \operatorname{sen} \beta$ ;
- ii)  $\triangle ADE$ ,  $AD = DE \cdot \operatorname{cos} \alpha$  e  $AE = DE \cdot \operatorname{sen} \alpha$ ;
- iii)  $\triangle BEF$ ,  $BE = EF \cdot \operatorname{cos} \alpha = \operatorname{sen} \beta \operatorname{cos} \alpha$  e  $BF = EF \cdot \operatorname{sen} \alpha = \operatorname{sen} \beta \operatorname{sen} \alpha$ ; e
- iv)  $\triangle CDF$ ,  $CD = \operatorname{sen}(\alpha + \beta)$  e  $CF = \operatorname{cos}(\alpha + \beta)$ .

Concluimos que,

$$\begin{aligned} \operatorname{cos} \alpha \operatorname{cos} \beta &= AD \\ &= BF + FC \\ &= \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta + \operatorname{cos}(\alpha + \beta) \end{aligned}$$

Ou seja,

$$\operatorname{cos}(\alpha + \beta) = \operatorname{cos} \alpha \operatorname{cos} \beta - \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta. \quad \blacksquare$$

**39.** Pela figura 29, queremos provas que  $\theta = \alpha + \beta$ .




Figura 29



Temos que  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{1}{3}$ ,  $\operatorname{tg} \beta = \frac{1}{2}$  e  $\operatorname{tg} \theta = 1$ . Utilizando a tangente da soma, chegamos a

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(\alpha + \beta) &= \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta} \\ &= \frac{\frac{1}{3} + \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}} \\ &= \frac{\frac{5}{6}}{1 - \frac{1}{6}} \\ &= 1 \\ &= \operatorname{tg} \theta \\ \alpha + \beta &= \theta. \end{aligned}$$

40.

- a) Basta desenvolver os dois membros da equação.  
 b) Basta desenvolver os dois membros da equação.  
 c) (Extraído da Olimpíada Cearense de Matemática)  
 Supondo que  $\operatorname{tg} \left( \frac{\alpha}{2} \right) = \frac{p}{q}$ ,  $p$  inteiro e  $q$  inteiro não nulo e usando as identidades dos itens a e b teremos

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{\frac{2p}{q}}{1 + \frac{p^2}{q^2}} = \frac{2pq}{p^2 + q^2} \text{ e } \operatorname{cos} \alpha = \frac{1 - \frac{p^2}{q^2}}{1 + \frac{p^2}{q^2}} = \frac{q^2 - p^2}{q^2 + p^2},$$

o que conclui que  $\operatorname{cos} \alpha$  e  $\operatorname{sen} \alpha$  são também racionais. ■

- d) Basta desenvolver os dois membros da equação.  
 e) (Extraído da Olimpíada Cearense de Matemática)  
 Utilizando a identidade do item d teremos que

$$\begin{aligned} \operatorname{tg} \left( \frac{\alpha}{2} \right) &= \operatorname{cosec} \alpha - \operatorname{cotg} \alpha \\ &= \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} - \frac{\operatorname{cos} \alpha}{\operatorname{sen} \alpha} \end{aligned}$$

Daí, como  $\alpha \neq k\pi$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  e portanto a divisão por  $\operatorname{sen} \alpha$  existe, a  $\operatorname{tg} \left( \frac{\alpha}{2} \right)$  é racional.

41. (Extraído do vestibular da UERJ RJ)  
 Sendo  $\alpha = \widehat{BAC}$  e  $\beta = \widehat{CAB}$ , teremos  $\widehat{BAD} = \alpha + \beta$ . Daí,  
 $\operatorname{tg} \alpha = \frac{20}{30} = \frac{2}{3}$ ,  $\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{150}{30} = 5$ . Assim,

$$\begin{aligned} 5 &= \operatorname{tg}(\alpha + \beta) \\ &= \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta} \\ &= \frac{\frac{2}{3} + \operatorname{tg} \beta}{1 - \frac{2}{3} \cdot \operatorname{tg} \beta} \end{aligned}$$

Consequentemente,

$$\begin{aligned} 5 - \frac{10}{3} \cdot \operatorname{tg} \beta &= \frac{2}{3} + \operatorname{tg} \beta \\ 15 - 10 \cdot \operatorname{tg} \beta &= 2 + 3 \operatorname{tg} \beta \\ \operatorname{tg} \beta &= 1. \end{aligned}$$

Por fim,  $\beta = 45^\circ$ , que está na letra **B**.

42. Com  $\operatorname{sen} x + \operatorname{cos} x = \sqrt{2}$ , teremos

$$\begin{aligned} (\operatorname{sen} x + \operatorname{cos} x)^2 &= (\sqrt{2})^2 \\ \operatorname{sen}^2 x + 2 \operatorname{sen} x \operatorname{cos} x + \operatorname{cos}^2 x &= 2 \\ 1 + \operatorname{sen}(2x) &= 2 \\ \operatorname{sen}(2x) &= 1. \end{aligned}$$

43. Observe que  $\widehat{CAD} = \alpha - \beta$  e:

- i)  $AB = \frac{1}{\operatorname{cos} \beta} = \sec \beta$ ;      iv)  $BD = \operatorname{tg} \alpha$ ;  
 ii)  $AD = \frac{1}{\operatorname{cos} \alpha} = \sec \alpha$ ;      v)  $DC = \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta$ ;  
 iii)  $BC = \operatorname{tg} \beta$ ;      vi)  $\widehat{ADC} = 90^\circ - \alpha$ ; e  
 vii)  $\operatorname{sen}(90^\circ - \alpha) = \operatorname{cos} \alpha$ .

a) Pela lei dos senos, obteremos que

$$\begin{aligned} \frac{1}{\operatorname{cos} \beta} &= \frac{\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta}{\operatorname{sen}(90^\circ - \alpha)} \\ \frac{\operatorname{sen}(\alpha - \beta)}{\operatorname{cos} \alpha \operatorname{cos} \beta} &= \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta \\ \operatorname{sen}(\alpha - \beta) &= \operatorname{sen} \alpha \operatorname{cos} \beta - \operatorname{sen} \beta \operatorname{cos} \alpha. \end{aligned}$$

b) Pela lei dos cossenos, teremos que

$$(\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta)^2 = \sec^2 \alpha + \sec^2 \beta - 2 \cdot \frac{\operatorname{cos}(\alpha - \beta)}{\operatorname{cos} \alpha \operatorname{cos} \beta}.$$

Desenvolvendo as expressões anteriores e utilizando que

$$\operatorname{tg}^2 \alpha - \sec^2 \alpha = -1 \text{ e } \operatorname{tg}^2 \beta - \sec^2 \beta = -1$$

encontraremos

$$\begin{aligned} -1 - 1 - 2 \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta &= -2 \cdot \frac{\operatorname{cos}(\alpha - \beta)}{\operatorname{cos} \alpha \operatorname{cos} \beta} \\ \frac{\operatorname{cos}(\alpha - \beta)}{\operatorname{cos} \alpha \operatorname{cos} \beta} &= 1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta \\ \operatorname{cos}(\alpha - \beta) &= \operatorname{cos} \alpha \operatorname{cos} \beta + \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta. \end{aligned}$$

44. (Extraído da Olimpíada de Matemática da China)  
 Como  $x + 5, y - 2 \in [-14, 14]$ , podemos escrever  $x + 5 = 14 \cos \theta$  e  $y - 12 = 14 \sin \theta$ , para  $\theta \in [0, 2\pi[$ . Sendo assim,

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= (14 \cos \theta - 5)^2 + (14 \sin \theta + 12)^2 \\ &= 365 - 140 \cos \theta + 336 \sin \theta \\ &= 365 + 28(12 \sin \theta - 5 \cos \theta) \\ &= 365 + 28 \cdot 13 \sin(\theta - \alpha) \\ &= 365 + 364 \sin(\theta - \alpha), \end{aligned}$$

com  $\operatorname{tg} \alpha = \frac{5}{12}$ . Daí, o mínimo  $x^2 + y^2$  ocorrerá quando  $365 + 364 \sin(\theta - \alpha)$  for o menor possível. Ou seja, quando  $\sin(\theta - \alpha) = -1$ . O que resulta em  $\min \{x^2 + y^2\} = 1$ . Isso ocorre quando  $\theta = \frac{3\pi}{2} + \operatorname{arctg} \frac{5}{12}$ , ou seja,  $x = \frac{5}{13}$  e  $y = -\frac{12}{13}$ . A resposta está na letra **B**.

45. (Extraído do Banco de Questões da OBMEP - 2015)

a) Observe que

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(45^\circ - k) + 1 &= \frac{\sin(45^\circ - k)}{\cos(45^\circ - k)} + 1 \\ &= \frac{\sin 45^\circ \cos k - \cos 45^\circ \sin k}{\cos 45^\circ \cos k + \sin 45^\circ \sin k} + 1 \\ &= \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \cos k - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin k}{\frac{\sqrt{2}}{2} \cos k + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin k} + 1 \\ &= \frac{\cos k - \sin k}{\cos k + \sin k} + 1 \\ &= \frac{1 - \operatorname{tg} k}{1 + \operatorname{tg} k} + 1 \\ &= \frac{2}{1 + \operatorname{tg} k}. \end{aligned}$$

Consequentemente,  $(\operatorname{tg}(45^\circ - k) + 1)(\operatorname{tg} k + 1) = 2$ . ■

b) O item anterior nos permite agrupar os primeiros 44 termos do produto dado, através de pares da forma  $(\operatorname{tg}(45^\circ - k) + 1)(\operatorname{tg} k + 1)$ , em 22 produtos iguais a 2. Como  $1 + \operatorname{tg} 45^\circ = 2$ , segue que  $2^n = 2^{23}$  e  $n = 23$ .